



## AMIODARONE suspension orale 5 mg/mL

Ingrédients	Quantité
Amiodarone 200 mg/comprimé	5 comprimés
Ora Blend SF	Qs ad 200 mL

Matériel
Mortier et pilon
Cylindres gradués
Tige de verre

### Procédure

- Triturer les comprimés dans le mortier pour obtenir une poudre fine.
- Mouiller la poudre avec une petite quantité de Ora Blend SF pour obtenir une pâte épaisse.
- Incorporer graduellement une partie du véhicule de suspension dans le mortier et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une suspension uniforme.
- Transférer la suspension dans le cylindre gradué et utiliser environ 15 mL du véhicule restant pour rincer le mortier, puis vider dans le cylindre. Répéter l'opération.
- Compléter jusqu'au volume désiré avec le véhicule et agiter la suspension avec une tige de verre pour l'homogénéiser.
- Transvider le mélange dans une bouteille ambrée.

### Stabilité

91 jours

### Conservation

Réfrigérateur

### Remarques

Ora Blend SF peut être substitué par Ora Blend.

Bien triturer les comprimés; la suspension aura une apparence granuleuse.

Bien agiter avant usage.

### Références

- Nahata MC, Morosco RS, Hipple TF. Stability of amiodarone in extemporaneous oral suspensions prepared from commercially available vehicles. J Pediatr Pharm Pract. 1999; 4:186-9
- Nahata MC. Stability of amiodarone in an oral suspension stored under refrigeration and at room temperature. Ann Pharmacother. 1997; 31:851-2.

### Révision

Juin 2022